

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen soll eine Darmspiegelung durchgeführt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie Ihr **Marcumar** vorher absetzen. Erfahrungsgemäß sollte das Medikament etwa **10 Tage vor** der Untersuchung abgesetzt werden. Die Auswirkung kann aber von Patient zu Patient sehr schwanken. Setzen Sie sich daher bitte rechtzeitig mit ihrem Hausarzt in Verbindung, er kennt Ihre Reaktionen auf die Marcumarwirkung am besten.

Ihr Hausarzt wird im Verlauf auch eine Blutprobe entnehmen müssen, um den Grad der Blutverdünnung (den sogenannten Quickwert oder INR) bestimmen zu können. Ab einem bestimmten Quickwert bzw. INR ist es erforderlich, dass Sie sich 2 x täglich eine Spritze unter die Haut geben (lassen) müssen. Für solche Spritzen haben wir Ihnen bereits ein Rezept ausgestellt.

Diese bewährte und etablierte Vorgehensweise schützt Sie einerseits vor Blutgerinnseln und andererseits verringert sie das Risiko einer Dickdarmlutung für den Fall, dass Polypen entfernt oder Proben entnommen werden müssen.



Für die Darmspiegelung benötigen Sie einen Quickwert von mindestens 60% und einen Laborbefund, der dies nachweist und der nicht älter als 5 Tage ist



Am Morgen der Untersuchung spritzen Sie sich bitte nicht!

Wenn wir keinen aktuellen Quickwert vorliegen haben oder der Wert weniger als 60% beträgt, können wir zwar die Darmspiegelung durchführen, dürfen dann aber keine Polypen entfernen oder Proben entnehmen. Das Risiko einer Blutungskomplikation ist dann zu groß. Zu diesem Zweck müsste dann die Darmspiegelung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden.

Wenn der Befund der Darmspiegelung unauffällig ist, können Sie abends wieder mit der Einnahme von Marcumar beginnen. Sie müssen sich jedoch zunächst die Spritzen wie gehabt 2 x täglich weiter ge-

ben, bis ein bestimmter Quickwert wieder erreicht ist. Ihr Hausarzt berät Sie hierzu auch kompetent.



Nur am Untersuchungstag geben Sie sich bitte nur einmal eine Spritze und zwar **nach der Untersuchung**, innerhalb der ersten 6 Stunden.

Für den Fall, dass bei Ihnen Polypen entfernt oder Proben entnommen wurden, warten Sie bitte 5 Tage, bevor Sie wieder mit dem Marcumar beginnen.



## PATIENTEN-INFORMATION

### Zum Umgang mit Marcumar vor und nach einer Darmspie- gelung

Terminvereinbarung

Telefon: 0451 290449-0

### Telefonzeiten der Praxis:

Mo, Di, Do: 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr

Mi: 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 12:30 Uhr



Colo-Proktologische Praxis  
Dr. med. Okroi

Colo-Proktologische Praxis  
Dr. med. Mathias Okroi

Rathausgasse 2  
23611 Bad Schwartau  
Telefon: (0451) 290449-0 Telefax:  
(0451) 290449-19

info@coloproktologie-zentrum.de  
www.coloproktologie-zentrum.de



Colo-Proktologische Praxis  
Dr. med. Okroi